

FOTOGRAFÍA MÉDICA

Epiglotis alta en niños: Una peculiar variante anatómica. Fotografía médica.

Hernández C.¹; Hernández R. ¹; Planchet C.²



Paciente escolar femenino de 7 años atendida en el Servicio de Pediatría en el Hospital Universitario de Caracas durante el mes de noviembre del 2023, quien presenta epiglotis alta a nivel de C2, visible en la faringe a la exploración física.

1. Estudiante de Medicina Escuela "Luis Razetti" Universidad Central de Venezuela.
2. Pediatra neumonólogo. Profesor de la Facultad de Medicina, UCV. Jefe del Departamento de Pediatría del HUC, UCV. Director del Posgrado de Pediatría del HUC, UCV.

Email:
hernandezccynthia@gmail.com

Cynthia Verónica Hernández
Campuzano.
ORCID: 0009-0007-7577-1765

Gustavo Antony Hernández
Rodríguez.
ORCID: 0009-0000-3985-057X

Jenny Antonieta Planchet
Corredor.
ORCID: 0000-0002-6599-8823

Recibido: 28 de Julio 2024
Aprobado: 02 de Febrero 2025

Para citar este artículo/For
reference this article:

Hernández C., Hernández R.,
Planchet C. Epiglotis alta en
niños: Una peculiar variante
anatómica. Fotografía médica.
Revisión Científica. Acta Cient
Estud. 2025; 17(1): 26-27

ISSN 2542-3428

Epiglottis alta en niños: Una peculiar variante anatómica. Fotografía médica.

High epiglottis in children: A peculiar anatomical variant. Medical photograph.

Reporte de caso de paciente escolar femenina de 7 años atendida en el Servicio de Pediatría en el Hospital Universitario de Caracas durante el mes de noviembre del 2023, quien presenta epiglottis alta a nivel de C2, visible en la faringe a la exploración física como un hallazgo incidental, sin referir sintomatología asociada. Este hallazgo se clasifica no patológico en niños asintomáticos, como parte del descenso gradual de la laringe desde el nacimiento hasta la adolescencia [1,2]. Los reportes de personas con epiglottis alta o visible son poco frecuentes, pero estudios realizados en Alemania indican que dicha variante anatómica se encuentra presente en el 1% de las personas, incluyendo adultos, [3] y en el 6% de los niños entre 6 y 10 años [4].

Palabras clave: Epiglottis, pediatría, variación anatómica.

A case report of a 7-year-old female school patient treated at the Pediatrics Department of the Hospital Universitario de Caracas during November 2023, who presented high-rising epiglottis at the level of C2, visible in the pharynx on physical examination as an incidental finding, with no associated symptoms. This finding is classified as non-pathological in asymptomatic children, as part of the gradual descent of the larynx from birth to adolescence [1,2]. Reports of people with high-rising or visible epiglottis are rare, but studies in Germany indicate that this anatomical variant is present in 1% of people, including adults, [3] and in 6% of children between the ages of 6 to 10 [4].

Key words: High-rising epiglottis, pediatrics, anatomic variation.

Conflicto de intereses

No se presentan conflictos de interés.

Referencias bibliográficas

1. Petkar N, Georgalas C, Bhattacharyya A. High-rising epiglottis in children: Should it cause concern? J Am Board Fam Med [Internet]. 2007 [citado 15 de noviembre de 2023];20(5):495-6. Disponible en: <https://www.jabfm.org/content/jabfp/20/5/495.full.pdf>
2. Alamri Y, Stringer MD. A high-rising epiglottis: A benign anatomical variant. Clin Anat [Internet]. 2011 [citado 15 de noviembre de 2023];24(5):652-4. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1002/ca.21145>
3. Jamaluddin Ahmed F, Shinohara AL, Bonifácio da Silva SM, Andreo JC, Rodrigues A de C. Visible epiglottis in children. Int J Clin Pediatr Dent [Internet]. 2014 [citado 15 de noviembre de 2023];7(3):223-4. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5005/jp-journals-10005-1271>.
4. Raghavendran, S., & Vas, L. (2000). The Visible Epiglottis Revisited. Anesthesia & Analgesia, 91(1), 249. doi:10.1213/00000539-200007000-00060



www.actacientificaestudiantil.com.ve

Acta Cient Estud. 2025;17 (1)

ISSN 2542-3428; Depósito legal DC2025000483